

# Wann findet man den Japankäfer

## LEBENSZYKLUS VON POPILLIA JAPONICA

### DIE ERWACHSENEN KÄFER SCHLÜPFEN

Die erwachsenen Käfer kommen zwischen Mitte Mai und Mitte Juli aus der Erde und sind bis September aktiv.

### VERPUPPUNG

Nachdem die Larven im Frühling einige Wochen an den Wurzeln gefressen haben, beginnt die Verpuppung

### HAUPTFLUG


Die erste Käferwelle findet Ende Juni statt. In den ersten Juliwochen kommt es dann zum Hauptflug der Käfer.

### WIRTSPFLANZEN

Die Käfer ernähren sich von über 400 Wirtspflanzen wie Mais, Weinreben, Soja, Steinobst, Kleinobst und Landschaftsbäumen.

### 3 ENTWICKLUNGSTADIEN DER LARVEN

Die Weibchen können bis zu 60 Eier legen, aus denen die ersten Larven schlüpfen. Die Larven wachsen und ernähren sich von feinen Wurzeln und organischem Material 2,5-5 cm unter der Erde. Sie häuten sich bis zum Spätherbst zweimal. Die Larven stellen dann die Nahrungsaufnahme ein und überwintern in ihrem dritten Stadium in 5-10 cm Tiefe.



**IPM Popillia**  
Integrated Pest Management of Japanese Beetle