

Quando se consegue detetar o Escaravelho japonês

CICLO DE VIDA DE POPILLIA JAPONICA

ECLOSÃO DOS ESCARAVELHOS ADULTOS

Os escaravelhos adultos eclodem do solo de meados de maio a meados de julho e estão activos até setembro.

PUPAÇÃO

A reprodução ocorre numa pequena célula após algumas semanas de alimentação na primavera.

VOO PRIMÁRIO


A primeira vaga de escaravelhos ocorre no final de junho, com um pico de voo durante as primeiras semanas de julho.

PLANTAS HOSPEDEIRAS

Os escaravelhos alimentam-se de mais de 400 plantas hospedeiras, como o milho, a videira, a soja, os frutos de carço, os pequenos frutos e árvores ornamenta.

LARVAS DE PRIMEIRO, SEGUNDO E TERCEIRO ESTADO

As fêmeas podem pôr até 60 ovos, a partir dos quais se desenvolvem as larvas de primeiro estado. As larvas alimentam-se de raízes finas e de matéria orgânica a 2,5-5 cm abaixo do solo. As larvas param de se alimentar no final do outono e passam o inverno no solo, a cerca de 5-10 cm de profundidade.



IPM Popillia
Integrated Pest Management of Japanese Beetle