

Mikor észlelheti a japán cserebogarat

A JAPÁN CSEREBOGÁR ÉLETCIKLUSA

KIFEJLETT BOGARAK KIKELÉSE

Az imágók május közepétől július közepéig kelnek ki a talajból, és szeptemberig aktívak.

BÁB ÁLLAPOT

A bábozódás egy kis üregben történik néhány hét tavaszi táplálkozás után.

RAJZÁS


Az imágók első kirepülési hulláma június végén várható, a rajzáscsúcs túlnyomórészt július első heteiben figyelhető meg.

GAZDANÖVÉNYEK

A bogarak több mint 400 növényen táplálkoznak, mint például a kukorica, szőlő, szója, csonthéjasok, bogyósok és tájfák.

AZ ELSŐ, MÁSODIK ÉS HARMADIK STÁDIUMÚ LÁRVÁK

A nőstény akár 60 tojást is lerakhat, amelyből kikelnek az első lárvák. A lárvák fejlődésük során a talajban 2,5-5 cm mélyen hajszálgökökkel és szerves anyagokkal táplálkoznak. Késő őszig kétszer vedlenek. A lárvák ekkor abbahagyják a táplálkozást, és 5-10 cm talaj mélységben a harmadik lárvastádiumban áttelelnék.



IPM Popillia
Integrated Pest Management of Japanese Beetle